

Almohadillas de feromonas para polillas comunes

ENTOPEST
INSECT CONTROL

Este producto se ha desarrollado especialmente para el control de la *Tineola bisselliella* (polilla común de la ropa, también conocida como polilla del musgo).

La trampa de feromonas para polillas Entopest libera una feromona sexual artificial (cebo) para atraer a las polillas macho al panel adhesivo indeleble. La atracción de polillas macho ayuda a romper el ciclo de vida y, por consiguiente, a controlar una infestación existente. Las trampas también pueden utilizarse como método proactivo para capturar polillas macho antes de que se establezcan o para indicar una infestación que puede haberse establecido en la propiedad.

Es importante señalar que la feromona de la polilla Entopest es muy específica de la *Tineola bisselliella*. El cebo también es parcialmente atractivo para otras especies estrechamente relacionadas, como la *Tinea pellionella* (polilla de la ropa encamisada) y la *Monopis crocipitella* (polilla de dorso pálido). Sin embargo, la captura de estas especies no está garantizada.



En función del tipo de kit adquirido, dispondrá de Almohadillas de feromonas con perchas, almohadillas de repuesto sin perchas o un paquete combinado que contiene otros accesorios como insecticidas y generadores de humo.

Una vez instaladas las trampas, deben colocarse directamente en la zona principal de infestación. La percha ha sido diseñada para ser versátil. Puede colgarse directamente de una barra de colgar o del pomo de una puerta, colocarse en espacios reducidos (lo que resulta más fácil gracias a su diseño plano) o fijarse directamente a la pared utilizando el orificio para clavos integrado.

Si ha adquirido las trampas sin las perchas, puede utilizarlas solas. Sin embargo, recomendamos utilizar las perchas para evitar que el adhesivo pegajoso entre en contacto con la ropa, que puede ser difícil de quitar.

Las almohadillas adhesivas de feromonas contienen un atrayente de feromonas de liberación lenta impregnado en el adhesivo; no se necesitan pastillas atrayentes adicionales. Una vez retiradas las almohadillas adhesivas, éstas durarán aproximadamente de 8 a 12 semanas, aunque este tiempo puede reducirse en entornos polvorientos. Es importante comprobar las trampas con regularidad para asegurarse de que siguen siendo adhesivas.

Identificación de *Tineola bisselliella*

Las *Tineola bisselliella* son pequeñas polillas con una longitud aproximada de 6-7 mm. Se reconocen por su color amarillo- marrón, las escamas rojas y peludas de la cabeza, las espinas de las patas y las alas con flecos. A menudo se confunden con otras especies de polillas. Nuestras trampas muestran resultados diferentes con otras especies de polillas.



La *Tineola bisselliella* suele encontrarse cerca de los armarios, en dormitorios, áticos y otros lugares de la casa y, si no se controla, puede causar daños importantes en la ropa y los materiales que contienen fibras naturales.

Polillas, contra las que esta trampa SÍ funcionará:

Aunque anunciamos que la trampa sólo funciona con *Tineola bisselliella*, sabemos, tanto por las pruebas realizadas como por los comentarios de los clientes, que la feromona puede atraer a otras especies de polillas, con un éxito parcial. Normalmente recomendamos un tratamiento insecticida adicional para las especies de polillas distintas de la *Tineola bisselliella*.

Polilla derecha	Éxito parcial	
		
Polilla de la ropa <i>Tineola bisselliella</i>	Polilla de la ropa <i>Tinea pellionella</i>	Polilla de la ropa de dorso pálido <i>Monopis crocipitella</i>
		
Si las polillas están activas en el momento de colocar las trampas, verá una buena captura de polillas.	Las feromonas son similares a las de la <i>Tineola bisselliella</i> , pero la captura varía según la estación. También conocida como polilla de la alfombra.	Especie indirecta de polilla de la ropa. Cabe esperar capturas limitadas. Normalmente se asocia con el adelgazamiento del cabello.


Polillas para las que la trampa NO funciona:

Como en Europa hay más de 3000 especies de micropolillas, es frecuente que otras polillas se confundan con la *Tineola bisselliella*. Independientemente de la polilla, este kit de feromonas no funcionará. Algunas de las especies de polillas más comunes que suelen encontrarse en los hogares son:

No funciona contra		
		
Polilla de los frutos secos <i>Plodia interpunctella</i>	Polilla marrón <i>Hofmannophila pseudospretella</i>	Polilla de los hombros blancos <i>Endrosis sarcitrella</i>
		

Prepare los soportes de las trampas (si dispone de ellos):

Nuestros colgadores son fáciles de instalar. Cuando utilice nuestros soportes profesionales para trampas entopest, simplemente dóblelos por el centro del pliegue hasta que queden totalmente cerrados y asegúrese de que las tres lengüetas quedan enganchadas en las ranuras laterales.

Primer paso	Paso 2	Paso 3
		
Ha recibido la percha del pestillo en posición abierta, lo que requiere montaje.	Dobla suavemente el pliegue en el centro del párpado y tira de él hacia abajo	Asegúrese de que los tres clips laterales encajan firmemente en la base para evitar que la trampa se vuelva a abrir.
Paso 4	Paso 5	Paso 6
		
Retire la tira de soporte de una almohadilla de feromonas, empezando por la esquina.	Recomendamos retirar la tira de soporte rápidamente y de un solo movimiento.	Coloque la almohadilla de feromonas con el lado adhesivo hacia fuera directamente en la percha desde arriba.

Nuestras almohadillas adhesivas son extremadamente pegajosas y puede resultar difícil retirar la tira de soporte. Esto suele ocurrir durante el transporte en días calurosos. Coloque las almohadillas de feromonas en el congelador durante 5 minutos para solucionar este problema.

Colocación de las trampas

Coloque las trampas en zonas con actividad conocida de polillas o en zonas donde se sospeche que hay actividad de polillas. Algunas zonas comunes son:

- Detrás o debajo de muebles que se mueven poco, especialmente con alfombras de lana.
- En armarios, especialmente donde se guarda lana o pieles.
- En áticos o buhardillas.
- En armarios bajo las escaleras.

Las trampas pueden fijarse a la pared, colgarse de un poste en el armario o colocarse sobre una superficie plana. Si no está seguro de la ubicación de la infestación, mueva las trampas hasta que se registren las capturas. El tiempo necesario para capturar polillas varía. Entopest recomienda dejar la trampa colocada durante al menos dos semanas para dar tiempo a las polillas a localizarla. Una vez que haya detectado un foco, siga moviendo todas las trampas para localizar las zonas de actividad.

En un armario	Bajo muebles	En las paredes
		
Colgado en barras de confección existentes.	Perfil plano para espacios reducidos.	Colóquelo sobre objetos altos o utilice el portaúñas integrado.

Trampas

La colocación correcta de la trampa es crucial. Para conseguir el mejor efecto de captura, recomendamos colocar la trampa directamente en la zona principal de infestación. Es posible que tenga que mover las trampas y probar diferentes ubicaciones para conseguir los mejores resultados.

- El flujo de aire y la luz pueden ser un factor. Entopest no recomienda colocar las trampas cerca de ventanas abiertas o a la luz directa del sol.
- Es aconsejable comprobar las trampas con regularidad y sustituir la almohadilla adhesiva si es necesario cuando esté llena o ya no se pegue.
- Si tiene problemas para despegarlas (esto ocurre cuando las almohadillas se calientan durante el transporte), colóquelas en el congelador durante 5 minutos y después despegue la película protectora lo antes posible.
- Las larvas (orugas) de estas polillas se alimentan de objetos que contienen fibras animales como lana, pieles, etc. Colocar trampas cerca de objetos que contengan dichas fibras puede ayudar a identificar las zonas de actividad.

Pasos de control adicionales

Confiar en un único método de control tendrá un impacto limitado sobre las poblaciones de polillas. Las polillas son difíciles de controlar y es importante tener en cuenta que normalmente se requieren medidas adicionales para un control completo y a largo plazo de una infestación establecida.

Otros métodos de control son:

- Aspirar las alfombras de lana, prestando atención a los lugares de difícil acceso donde pueden encontrarse larvas de polilla. Por ejemplo, debajo de muebles y alfombras que se mueven poco.
- Compruebe la ropa de lana o seda. Si se detecta actividad de polillas, las prendas deben meterse en el congelador durante varios días o lavarse en la lavadora en el ciclo más caliente.
- Compruebe todos los artículos infestados hechos de pieles de animales y retírelos.
- En caso de infestaciones graves, las zonas infestadas deben tratarse con un insecticida residual u otros productos como parte de un programa de gestión integrada de plagas (GIP).

Entopest dispone de una gama de productos adecuados para el control de las polillas, incluidos generadores de humo para insectos que pueden controlar las polillas voladoras rápidamente y sin dejar residuos duraderos. También ofrecemos insecticidas con un regulador del crecimiento de insectos incorporado para controlar las polillas hembras y sus larvas o sprays residuales para alfombras.

Una solución no tóxica y permanente es el uso de trampas de feromonas en combinación con tierra de diatomeas (fossilizada restos de diatomeas) para el control de insectos, que puede ser muy eficaz si se utiliza correctamente.

Para más información sobre nuestros productos o si necesita ayuda adicional:

www.entopest.co.uk