

Trampas de Feromonas para Polilla de la ropa & Polilla de la casa

ENTOPEST
INSECT CONTROL

Gracias por elegir las trampas para polillas Entopest, una solución segura y eficaz para controlar las infestaciones de polillas en su hogar o negocio. Ya se trate de polillas de la casa o de la ropa, estas trampas proporcionan un método fácil de usar para proteger sus pertenencias y mantener un entorno libre de polillas.

Dependiendo del tipo de compra, recibirá trampas para polillas de la ropa, trampas para polillas de la casa o una combinación que incluye ambas. Cada trampa está envuelta individualmente para mayor frescura y comodidad.

Estos productos han sido diseñados específicamente para el control de la *Tineola bisselliella* (polilla común de la ropa) y la polilla de la casa (*Plodia interpunctella*).

La trampa de feromonas para polillas Entopest emite una feromona sexual artificial (señuelo) para atraer a las polillas macho a la trampa de feromonas que no se puede escapar. La atracción de polillas macho ayuda a romper el ciclo de vida y, por consiguiente, a controlar las infestaciones establecidas. Las trampas también pueden utilizarse como método proactivo para capturar polillas macho antes de que se establezcan o como indicador de cualquier infestación que pueda estar desarrollándose en la propiedad.

Es importante señalar que la feromona de la polilla Entopest es altamente específica para la *Tineola bisselliella* y la polilla de la casa (*Plodia interpunctella*). El señuelo es parcialmente atractivo para otras especies estrechamente relacionadas, como *Tinea pellionella* (polilla de la ropa) y *Monopis crocipitella* (Polilla de almacenes) y la polilla de la harina o del tabaco (*Ephestia* spp.).

Una vez instaladas las trampas, deben colocarse directamente en la zona principal de infestación. La trampa ha sido diseñada para ser versátil y puede colgarse directamente en una barra de colgar o en el pomo de una puerta, o colocarse en áreas confinadas.

Las almohadillas adhesivas de feromonas contienen un atrayente de feromonas de liberación lenta que está impregnado en el pegamento; no se necesitan pastillas atrayentes adicionales. Una vez retirada la cáscara de la almohadilla adhesiva, las trampas durarán aproximadamente entre 8 y 12 semanas, pero este tiempo puede reducirse en entornos polvorientos. Es esencial comprobar las trampas con regularidad para asegurarse de que siguen pegajosas.

Identificación de la *Tineola bisselliella*

Las *Tineola bisselliella* son pequeñas polillas con una longitud aproximada de 6-7 mm. Se identifican por su color amarillo-marrón, escamas rojas con aspecto peludo en la cabeza, espinas en las patas y alas de borde con flecos. A menudo se confunden con otras especies de polillas. Nuestras trampas tienen resultados dispares en otras especies de polillas.




La *Tineola bisselliella* suele encontrarse alrededor de los armarios, en los áticos de los dormitorios y en otros lugares de una propiedad, y si no se controla, puede causar daños considerables a la ropa y a los materiales que contienen fibras naturales.



Polilla de la casa (*Plodia interpunctella*)

Se trata de pequeñas polillas con una longitud aproximada de 7-10 mm. Son características y pueden identificarse por sus alas bicolores separadas por una banda negra. Estas polillas pueden confundirse a menudo con otras especies de polillas. Nuestras trampas tienen resultados dispares en otras especies de polillas.


Macho *Plodia interpunctella*



Macho *Plodia interpunctella*

La polilla de la casa india suele encontrarse en las cocinas, sobre todo cuando se almacenan alimentos secos. La probabilidad de encontrar estas polillas aumenta si los alimentos secos se almacenan durante mucho tiempo o en un recipiente sin cerrar. Si no se controlan, pueden causar daños considerables a los alimentos almacenados. Las larvas suelen alimentarse de productos que contienen frutos secos, nueces, semillas, arroz y chocolate, y pueden observarse porque tejen telarañas.

La trampa para polillas de la casa es eficaz contra las siguientes polillas:



Polilla real		
		
Polilla de la casa <i>Plodia interpunctella</i>	Polilla mediterránea de la harina <i>Ephestia kuehniella</i>	Polilla del tabaco <i>Ephestia elutella</i>
		
Observará una buena captura de polillas si éstas están activas en el momento de colocar las trampas.	La feromona es similar a la de <i>Plodia interpunctella</i> , pero la captación variará en función de la época del año.	

Polillas contra las que funcionará la trampa:

Polilla real		
		
Polilla de la ropa <i>Tineola bisselliella</i>	Polilla marrón doméstica <i>Hofmannophila pseudospretella</i>	Oecophoridae <i>Endrosis sarcitrella</i>
		
Observará una buena captura de polillas si éstas están activas en el momento de colocar las trampas.	La feromona es similar a la de la <i>Tineola bisselliella</i> , pero la captación varía según la época del año. También conocida como polilla de la alfombra.	Especie indirecta de polilla de la ropa. Cabe esperar capturas limitadas. Normalmente se asocia con el pelo suelto.

Preparación de los soportes para trampas:

Nuestros colgadores son fáciles de montar.

Paso 1	Paso 2	Paso 3
		
Recibirá las trampas en una caja, con cada trampa envuelta individualmente para mayor protección y comodidad.	Despegue la tira protectora de la almohadilla de feromonas, empezando por la esquina.	Doble la trampa y meta la lengüeta en la ranura.

Recomendamos despegar la tira trasera rápidamente y en un solo movimiento. Ocasionalmente, puede resultar difícil retirar la tira de soporte, normalmente durante el transporte en días calurosos. Colocar las almohadillas de feromonas en el congelador durante 5 minutos resolverá este problema.

Colocación de las trampas

Coloque las trampas en zonas en las que se sepa que hay polillas o en zonas en las que se sospeche que hay polillas. Algunas zonas comunes son:

- Detrás o debajo de muebles que se mueven poco, especialmente donde hay alfombras de lana.
- En armarios, especialmente donde se guardan lanas o pieles.
- En áticos o desvanes.
- En armarios debajo de las escaleras.

Las trampas pueden montarse en la pared, colgarse de un poste en el armario o dejarse sobre una superficie plana.

En un armario	Bajo muebles
	
Cuelgue en los rieles de ropa existentes	El sifón de perfil bajo se adapta a espacios reducidos

Colocación de las trampas

Coloque las trampas en zonas de actividad conocida de polillas o en zonas donde se sospeche que hay actividad de polillas. Algunas zonas comunes son:

- Debajo de los muebles de cocina
- En el interior de los armarios de cocina, especialmente donde se almacenan cereales e ingredientes para hornear
- En los armarios, especialmente donde se guardan alimentos secos para mascotas.

En un armario de cocina	Bajo mueble de cocina	En paredes o armarios de cocina
		
Colocados en estanterías dentro de los armarios de la cocina cerca de posibles fuentes de alimentos, como cereales secos.	El sifón de perfil bajo se adapta a espacios reducidos.	Colóquelo sobre objetos altos o utilice el portaúñas integrado.

Nota

Si no está seguro de la ubicación de la infestación, desplace las trampas hasta que se registren las capturas. El tiempo necesario para capturar polillas variará. Entopest recomienda dejar la trampa in situ durante al menos dos semanas para permitir que las polillas localicen la trampa. Una vez que haya detectado un foco, siga moviendo todas las trampas para localizar las zonas de actividad.

Consejos de trampeo

La colocación correcta de la trampa es clave y, para obtener las mejores capturas, recomendamos colocar la trampa directamente en la zona principal de infestación. Es posible que tenga que mover las trampas y probar diferentes ubicaciones para obtener los mejores resultados.

- El flujo de aire y la luz pueden ser un factor. Entopest no recomienda colocar las trampas cerca de ventanas abiertas o a la luz directa del sol.
- Es aconsejable comprobar las trampas con regularidad y, si es necesario, cambiarlas cuando estén llenas o ya no estén pegajosas.
- Si tiene problemas para despegar la cáscara (esto ocurre cuando las trampas se calientan durante el transporte), colóquelas en el congelador durante 5 minutos y, a continuación, despegue la cáscara lo más rápidamente posible.
- Las larvas (orugas) de estas polillas se alimentan de artículos que contienen fibras animales; lana, pieles, etc. Colocar trampas cerca de artículos que contengan este tipo de fibras puede ayudar a detectar zonas de actividad.

Medidas de control adicionales

Confiar en un único método de control tendrá un impacto limitado sobre las poblaciones de polillas. Las polillas son difíciles de controlar, y es esencial tener en cuenta que normalmente se requieren medidas adicionales para el control total y a largo plazo de las infestaciones establecidas.

Los métodos de control adicionales incluyen:

- Aspirar alfombras de lana.
- Limpiar prestando atención a las zonas de difícil acceso donde pueden alimentarse las larvas de polilla. Por ejemplo, debajo de muebles y alfombras que se mueven poco.
- Comprobación de la ropa de lana o seda. Si se detecta la presencia de polillas, hay que meterlas en el congelador durante varios días o lavarlas en la lavadora con el ciclo de lavado más caliente.
- Compruebe y retire cualquier objeto de piel o cuero animal infestado.
- Cuando haya infestaciones importantes, las zonas infestadas deben tratarse con un insecticida residual u otros productos como parte de un programa de «gestión integrada de plagas» (GIP).
- Comprobar las mercancías de alto riesgo, como cereales y frutos secos, especialmente los artículos viejos o poco utilizados. Si se detecta actividad de la polilla, los artículos infestados deben retirarse del lugar.

Entopest dispone de una gama de productos adecuados para el control de las polillas, entre los que se incluyen trampas electrónicas para polillas y generadores de humo para insectos que pueden controlar rápidamente cualquier polilla voladora sin dejar residuos duraderos. También ofrecemos insecticidas con un regulador del crecimiento de los insectos incorporado para controlar las polillas hembras y sus larvas asociadas o sprays residuales para zonas enmoquetadas.

Para un enfoque no tóxico y duradero, el uso de trampas de feromonas en combinación con tierra de diatomeas (restos fosilizados de diatomeas) puede ser muy eficaz si se utiliza correctamente.

Para más información sobre nuestros productos o si necesita ayuda adicional:

www.entopest.co.uk