

Instructions pour la boîte à appât Roshield pour souris

ROSHIELD CONTROL

La boîte Roshield a été conçue pour permettre l'application sécurisée de rodenticides dans les zones d'activité des souris domestiques tout en empêchant les animaux non ciblés d'y accéder. Son design verrouillable et résistant aux manipulations respecte les réglementations sur l'utilisation sécurisée des rodenticides.

Il est peu probable que des espèces non visées entrent dans la boîte, mais pour minimiser ce risque, il est recommandé de placer la boîte dans un endroit discret, comme derrière une plinthe d'un meuble de cuisine. Utiliser des matériaux supplémentaires pour couvrir la boîte peut également réduire le risque d'interférence et augmenter la probabilité de consommation de l'appât par les souris.


Avant de placer la boîte, une inspection de la zone de traitement doit être effectuée afin d'identifier l'espèce nuisible et d'évaluer les risques à contrôler. Lors de cette inspection, il est essentiel d'identifier et d'éliminer toutes les sources de nourriture accessibles aux souris domestiques. Une des principales causes d'échec du traitement contre les souris est l'absence de suppression de leur source de nourriture. Tant que cette source reste disponible, les rongeurs n'auront que peu d'intérêt à chercher de nouvelles sources de nourriture.




À l'intérieur de la boîte :



La clé rouge est nécessaire pour ouvrir la boîte. Insérez la clé dans le trou situé à l'avant de la boîte et tournez ; le couvercle s'ouvrira automatiquement



À l'intérieur de la boîte, il y a un espace libre entre les deux points d'entrée. Cet espace doit rester vide pour permettre aux souris domestiques d'entrer librement.




Deux trous sont présents dans le fond de la boîte. Ils peuvent être utilisés pour fixer la boîte au sol à l'aide d'une vis afin d'empêcher qu'elle ne soit déplacée.

Appâter la boîte avec un rodenticide

Roshield propose deux formulations d'appâts rodenticides au Royaume-Uni et dans l'Union européenne : blocs et pâtes.

Avant d'entreprendre un traitement à l'aide d'un rodenticide, il est important de lire et de respecter les instructions figurant au dos de l'emballage.

La meilleure pratique consiste à utiliser la canne à appât (fournie avec les kits contenant des rodenticides) pour éviter que les rongeurs ne traînent le rodenticide en dehors de la boîte, ce qui pourrait entraîner la consommation de l'appât par des animaux non ciblés. La tige empêche également les rongeurs, en particulier les rats, de retirer l'appât de la boîte et de le stocker, ce qui empêche les autres rongeurs d'avoir accès à l'appât.

Blocks: 	Les blocs Roshield sont dotés d'un trou central qui permet de les enfiler facilement sur la tige d'appât située dans la chambre arrière de la boîte. Roshield recommande d'insérer 5 à 7 blocs sur la tige. Poser la tige sur les rainures latérales.	
Pasta: 	Les pâtes Roshield étant fabriquées dans un matériau souple, la canne à appât peut simplement être insérée directement à travers le sachet. Les sachets individuels doivent être retirés de l'emballage extérieur. Il n'est pas nécessaire d'enlever la pochette intérieure en papier, car les rats et les souris domestiques la rongent directement. Roshield recommande d'insérer 7 à 10 sachets sur la tige.	

Une fois l'appât installé, fermez bien le couvercle. La boîte est maintenant prête à être placée avec précaution et en toute sécurité dans la zone d'activité des rongeurs.

Les boîtes de Roshield doivent être placées près des terriers ou des zones où les rats se nourrissent activement. Ne placez pas les boîtes dans des zones ouvertes, car les rats sont plus prudents lorsqu'ils sont à l'air libre et ont moins de chances d'entrer dans la boîte. Les rats sont plus prudents lorsqu'ils sont à l'air libre et ont moins de chances d'entrer dans la boîte. Essayez de ne pas les placer directement sur une piste, juste à côté, ce qui augmente la probabilité d'entrée des rats.

Il peut s'écouler plusieurs jours avant que les rongeurs n'entrent dans les boîtes, car ils peuvent se montrer prudents à l'égard d'objets inconnus placés sur leur territoire. Il s'agit d'un problème courant qui n'est pas le signe d'un produit défectueux.

La quantité d'appât nécessaire pour contrôler une infestation varie. Toutefois, il est important de continuer à appâter jusqu'à ce que toute activité ait cessé, car un appât insuffisant peut entraîner l'échec du traitement.

La consommation de grandes quantités d'appâts par les rats n'est pas inattendue et peut être le signe d'une infestation plus importante que prévu.

L'activité peut augmenter après un traitement, car les rongeurs peuvent devenir lents après avoir consommé l'appât, ce qui signifie que la probabilité de repérer le rongeur est plus élevée. C'est un signe typique de l'efficacité du rodenticide. Il est important que les carcasses de rongeurs soient enlevées pour éviter que d'autres animaux ne mangent ces rongeurs morts.

Lorsque l'appât n'est plus consommé et que l'infestation semble avoir été éradiquée, il est important de retirer le contenu de la boîte et de le conserver en toute sécurité.