

Istruzioni per la Scatola per Esche Roshield per Topi

ROSHIELD CONTROL

La scatola Roshield è stata progettata per consentire l'applicazione sicura di rodenticidi nelle aree di attività dei topi domestici, impedendo allo stesso tempo l'accesso ad animali non bersaglio. Il design chiudibile a chiave e resistente alle manomissioni è conforme alle normative sull'uso sicuro dei rodenticidi.

È improbabile che specie non roditrici entrino nella scatola, ma per ridurre ulteriormente questo rischio, si consiglia di posizionare la scatola in un luogo discreto, come dietro una placca di un mobile da cucina. L'utilizzo di materiali aggiuntivi per coprire la scatola può anche aiutare a ridurre il rischio di interferenze e aumentare la probabilità che i topi consumino l'esca.


Prima di posizionare la scatola, è necessario effettuare un'ispezione dell'area di trattamento per identificare la specie infestante e qualsiasi rischio che potrebbe essere necessario controllare. Durante l'ispezione, è fondamentale identificare e rimuovere tutte le fonti di cibo a cui i topi domestici hanno accesso. Uno dei principali motivi di fallimento del trattamento contro i topi domestici è la mancata rimozione della loro fonte di cibo. Se questa fonte rimane, i roditori avranno poco interesse a cercare nuove fonti di cibo.




All'interno della scatola:



Per aprire la scatola è necessaria la chiave rossa. Inserire la chiave nel foro superiore situato nella parte anteriore della scatola e ruotarla; il coperchio si aprirà automaticamente.



All'interno della scatola c'è un'area libera tra i due punti di ingresso. Quest'area deve essere lasciata vuota per consentire ai topi domestici di entrare liberamente.



Sul fondo della scatola sono presenti due fori. Questi possono essere utilizzati per fissare la scatola al pavimento con una vite, evitando così che venga spostata.

Esca per la scatola con il rodenticida

Roshield ha due formulazioni di esche rodenticide disponibili nel Regno Unito e nell'UE: blocchi,e pasta.

Prima di effettuare qualsiasi trattamento con rodenticidi, è importante leggere e rispettare le istruzioni riportate sul retro della confezione.

Come prassi ottimale, è opportuno utilizzare l'asta per esche (inclusa nei kit contenenti rodenticidi) per evitare che i roditori trascinino il rodenticida al di fuori della scatola, con il rischio che animali non bersaglio consumino l'esca. L'asta impedisce inoltre ai roditori, in particolare ai ratti, di rimuovere l'esca dalla scatola e di conservarla, impedendo ad altri roditori di accedere all'esca.

Blocks: 	I blocchi Roshield sono progettati con un foro centrale che consente di infilare facilmente il blocco sull'asta per esche nella camera posteriore della scatola. Roshield consiglia di inserire 5-7 blocchi sull'asta. Appoggiare l'asta sulle scanalature laterali.	
Pasta: 	La pasta Roshield è prodotta in materiale morbido, la cannada pesca può essere semplicemente inserita direttamente attraverso la bustina. Le singole bustine devono essere rimosse dalla confezione esterna. Non è necessario rimuovere l'involucro di carta interno, perché ratti e topi domestici lo masticano direttamente. Roshield consiglia di inserire 7-10 bustine sull'asta.	

Una volta installata l'esca, chiudere saldamente il coperchio. La scatola è ora pronta per essere posizionata con cura e sicurezza nell'area di attività dei roditori.

Le cassette Roshield devono essere posizionate vicino alle tane o alle aree in cui i ratti si nutrono attivamente; non collocare le cassette in aree aperte, poiché i ratti sono più cauti quando sono all'aperto e hanno meno probabilità di entrare nella cassetta. Cercate di non posizionarle direttamente su una pista, ma solo di lato, per non aumentare la probabilità che i ratti vi entrino.

Potrebbero essere necessari diversi giorni prima che i roditori entrino nelle scatole, poiché i roditori possono essere cauti nei confronti di oggetti sconosciuti collocati nel loro territorio. Si tratta di un problema comune e non è segno di un prodotto difettoso.

La quantità di esca necessaria per controllare un'infestazione può variare. Tuttavia, è importante continuare a usare l'esca fino a quando non cessa l'attività, poiché una quantità insufficiente di esche può causare il fallimento dei trattamenti.

Il consumo di grandi quantità di esche da parte dei ratti non è inaspettato e può essere un segno di un'infestazione più estesa del previsto.

L'attività può aumentare dopo un trattamento, poiché i roditori possono diventare lenti dopo aver consumato l'esca e quindi la probabilità di individuare il roditore è maggiore. Questo è un tipico segno dell'azione del rodenticida. È importante rimuovere le carcasse dei roditori per evitare che altri animali mangino i roditori morti.

Quando l'esca non viene più utilizzata e sembra che l'infestazione sia stata debellata, è importante rimuovere il contenuto della scatola e conservarlo al sicuro.