

Instrucciones para la Caja de Cebo para Ratones Roshield




La caja Roshield ha sido diseñada para permitir la aplicación segura de rodenticida en áreas de actividad de ratones domésticos, al mismo tiempo que impide el acceso a animales no objetivo. El diseño bloqueable y resistente a manipulaciones cumple con las normativas sobre el uso seguro de rodenticidas. Es poco probable que especies no roedoras entren en la caja, pero para minimizar este riesgo, se recomienda colocar la caja en un lugar discreto, como detrás de un zócalo de un mueble de cocina. Utilizar materiales adicionales para cubrir la caja también ayudará a reducir el riesgo de interferencias y aumentará la probabilidad de que los ratones consuman el cebo.

Antes de colocar la caja, se debe realizar una inspección de la zona de tratamiento para identificar la especie de plaga y los riesgos que puedan necesitar controlarse. Durante la inspección, es esencial identificar y eliminar cualquier fuente de alimento a la que los ratones domésticos tengan acceso. Una de las principales razones del fracaso en el tratamiento contra los ratones domésticos es no eliminar su fuente de alimento. Si esta fuente permanece disponible, los roedores tendrán poco interés en buscar nuevas fuentes de alimento.




Dentro de la caja:



La llave roja es necesaria para abrir la caja. Inserte la llave en el agujero superior situado en la parte delantera de la caja y gírela; la tapa se abrirá automáticamente.

Dentro de la caja hay un espacio abierto entre los dos puntos de entrada. Este espacio debe permanecer vacío para permitir que los ratones domésticos entren libremente.




En el suelo de la caja hay dos agujeros. Estos pueden usarse para fijar la caja al suelo con un tornillo y así evitar que sea movida.

Cebat la caja con rodenticida

Roshield tiene dos formulaciones de cebo rodenticida disponibles en el Reino Unido y la UE: bloques y pasta.

Antes de emprender cualquier tratamiento con rodenticida, es importante que lea y respete las instrucciones que figuran en laparte posterior del envase.

Como práctica recomendada, debe utilizarse la varilla de cebo (incluida en los kits que contienen rodenticida) para ayudar a evitar que los roedores arrastren el rodenticida fuera de la caja, lo que puede provocar que animales no objetivo consuman el cebo. La varilla también evita que los roedores, especialmente las ratas, saquen el cebo de la caja y lo almacenen, lo que impide que otros roedores accedan al cebo.

Blocks: 	Los bloques Roshield están diseñados con un orificio en el centro que permite enroscarlos fácilmente en la varilla de cebo dentro de la cámara trasera de la caja. Roshield recomienda insertar entre 5 y 7 bloques en la varilla. Apoye la varilla en las ranuras laterales.	
Pasta: 	La pasta Roshield se fabrica como material blando, por lo que la varilla del cebo puede introducirse directamente a través de la bolsita. Los sobres individuales deben extraerse del embalaje exterior. No es necesario retirar la funda de papel interior, ya que las ratas y los ratones domésticos la masticarán directamente. Roshield recomienda insertar de 7 a 10 sobres en la varilla.	

Una vez instalado el cebo, cierre bien la tapa. La caja ya está lista para colocarla con cuidado y seguridad en la zona de actividad de los roedores.

Las cajas Roshield deben colocarse cerca de madrigueras o zonas en las que las ratas se alimenten activamente, no coloque las cajas en zonas abiertas, ya que las ratas son más cautelosas cuando están al aire libre y es menos probable que entren en la caja. Procure no colocarlas directamente sobre un corral, justo al lado aumenta la probabilidad de que las ratas entren.

Pueden pasar varios días antes de que los roedores entren en las cajas, ya que pueden ser cautelosos con los objetos desconocidos colocados en su territorio. Se trata de un problema habitual y no de un producto defectuoso.

La cantidad de cebo necesaria para controlar una infestación varía. Sin embargo, es importante seguir cebando hasta que cese toda actividad, ya que un cebado insuficiente puede hacer fracasar los tratamientos.

El consumo de grandes cantidades de cebo por parte de las ratas no es inesperado y puede ser señal de una infestación mayor de lo esperado.

La actividad puede aumentar después de un tratamiento, ya que los roedores pueden volverse lentos después de consumir el cebo, lo que significa que la probabilidad de detectar al roedor es mayor. Esta es una señal típica de que el rodenticida está funcionando. Es importante retirar los cadáveres de los roedores para evitar que otros animales se los coman.

Cuando ya no se tome el cebo y parezca que se ha erradicado la infestación, es importante retirar el contenido de la caja y guardarlo en un lugar seguro.