

Instructions pour la boîte d'appât pour souris Roshield




La boîte Roshield a été conçue pour permettre l'application en toute sécurité de rodenticides dans les zones d'activité des souris domestiques, tout en empêchant les animaux non ciblés d'y accéder. La conception verrouillable et inviolable est conforme aux réglementations relatives à l'utilisation en toute sécurité des rodenticides.

Ces instructions varient en fonction du kit acheté, et certains accessoires peuvent ne pas être inclus ; en cas de doute, veuillez vous référer à la liste à partir de laquelle l'achat a été effectué. Tous les kits ne comprennent pas de rodenticide.

Il est peu probable que des espèces autres que des rongeurs pénètrent dans la boîte, mais pour minimiser ce risque, il est recommandé de placer la boîte dans un endroit discret.

L'utilisation de matériaux supplémentaires pour recouvrir la boîte permet également de réduire le risque d'interférence et d'augmenter la probabilité que l'appât soit consommé par la souris. L'utilisation de matériaux supplémentaires pour recouvrir la boîte contribuera également à réduire le risque d'interférence et à augmenter la probabilité de consommation de l'appât par la souris.

Avant de placer la boîte, il convient d'effectuer une étude de la zone à traiter afin d'identifier les espèces nuisibles et les risques éventuels à contrôler. Au cours de cette étude, il est essentiel d'identifier et d'éliminer toutes les sources de nourriture auxquelles les souris domestiques ont accès. L'une des principales raisons de l'échec d'un traitement contre les souris domestiques est que la source de nourriture des souris n'est pas supprimée. Lorsque cette source de nourriture subsiste, le rongeur n'a que peu d'intérêt à chercher de nouvelles sources de nourriture.



Ouverture de la boîte et intérieur de la boîte -

Nous avons produit une vidéo montrant les instructions ; elle se trouve sur la liste Amazon où vous avez acheté les boîtes.


La clé rouge à deux branches est nécessaire pour ouvrir la boîte. Elle se trouve à l'arrière de l'une des boîtes de souris.	Insérez les dents de la clé dans les deux trous situés à l'avant de la boîte et poussez ; le couvercle s'ouvrira.	À l'intérieur de la boîte, il y a une zone ouverte entre les deux points d'entrée. Cette zone doit être laissée vide pour permettre aux souris domestiques d'y pénétrer librement.
Un pic est présent à l'arrière de la boîte. Elle peut être utilisée pour fixer des blocs ou des pâtes rodenticides afin de s'assurer que l'appât reste dans la boîte à tout moment.	Dans la plupart des cas, les boîtes peuvent être placées dans la zone d'activité sans qu'il soit nécessaire de les fixer. Dans certaines situations, il peut s'avérer utile de fixer les boîtes.	Deux trous sont présents dans le plancher du piège. Ils peuvent être utilisés pour fixer la boîte au sol à l'aide d'une vis afin d'éviter qu'elle ne soit déplacée.
	Deux trous sont présents sur le couvercle de la boîte. Ils permettent d'attacher la boîte à appâts à l'aide d'un fil de fer afin de la maintenir en position.	

Appâter la boîte avec un rodenticide

L'appât Roshield est disponible en trois formulations au Royaume-Uni et dans l'UE : blocs, blé et pâtes.

Avant d'entreprendre un traitement à l'aide d'un rodenticide, il est important de lire et de respecter les instructions figurant au dos de l'emballage.

La meilleure pratique consiste à utiliser le pic à appât pour éviter que les souris domestiques ne traînent le rodenticide en dehors de la boîte, ce qui pourrait entraîner la consommation de l'appât par des animaux non ciblés. Le pic augmente également la probabilité que les souris domestiques se nourrissent de l'appât. Il n'est pas possible d'utiliser des appâts à base de blé dans les boîtes d'appât en raison du risque de déversement ; Roshield ne recommande pas l'utilisation de blé dans les boîtes uniquement pour les formulations de pâtes et de blocs.

Blocks: 	Les blocs Roshield sont fabriqués avec un trou au centre, ce qui permet au bloc d'être facilement poussé sur la pointe de l'appât dans la chambre arrière de la boîte. Roshield recommande d'insérer un bloc sur la pointe.	
Pâtes : 	Les pâtes Roshield sont fabriquées dans un matériau souple qui peut facilement être poussé vers le bas sur la pointe de l'appât. Il n'est pas nécessaire d'enlever la pochette de papier interne ; les souris domestiques la rongent directement. Roshield recommande d'insérer 1 à 2 sachets sur l'épi.	

Une fois l'appât installé, fermez bien le couvercle. La boîte est maintenant prête à être placée avec précaution et en toute sécurité dans la zone d'activité des souris domestiques.

Les boîtes à souris de Roshield doivent être placées près des zones où les souris domestiques se nourrissent activement. Ne placez pas les boîtes dans des zones ouvertes, car les souris domestiques sont prudentes lorsqu'elles sont à l'air libre et ont moins de chances d'entrer dans la boîte. En outre, la présence d'excréments de souris domestiques est un bon signe d'activité, et les boîtes doivent être placées là où les excréments sont les plus nombreux. Dans la mesure du possible, évitez d'enlever les excréments de la zone dans laquelle les boîtes sont placées, car la présence d'excréments augmente la probabilité que les souris entrent dans les boîtes et accélère les délais de traitement.

Il peut s'écouler plusieurs jours avant que les souris n'entrent dans les boîtes, car elles peuvent se montrer prudentes à l'égard d'objets inconnus placés sur leur territoire. Il s'agit d'un problème courant qui n'est pas le signe d'un produit défectueux.

La quantité d'appât nécessaire pour contrôler une infestation varie. Il est important de noter que les souris domestiques se nourrissent de façon sporadique et consomment de petites quantités de nourriture provenant de plusieurs endroits. Il est donc nécessaire de placer plusieurs boîtes d'appât dans la zone d'alimentation de la souris pour s'assurer qu'elle consomme suffisamment d'appât. L'appâtage doit être poursuivi jusqu'à ce que l'activité cesse, car un appâtage insuffisant peut entraîner l'échec du traitement.


L'activité peut devenir plus apparente au début du traitement, car les souris domestiques peuvent devenir lentes après avoir consommé l'appât. C'est un signe typique de l'efficacité du rodenticide. Il est essentiel que les carcasses de rongeurs soient enlevées pour éviter que d'autres animaux ne mangent ces rongeurs morts.

Lorsque les appâts ne sont plus consommés et que l'infestation semble avoir été éradiquée, il est essentiel de retirer la boîte d'appât et de la conserver en lieu sûr.

Après le traitement

Une fois que la population a été contrôlée, des mesures doivent être prises pour empêcher toute réapparition. La protection des points d'entrée est une méthode couramment utilisée pour empêcher d'autres rongeurs de pénétrer dans la maison :

- Les souris peuvent accéder à un trou d'environ 5 mm de diamètre, soit à peu près le diamètre d'un stylo !
- Installer de la laine métallique ou du grillage pour combler les espaces autour des tuyaux et des câbles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
- Des bandes de frottement doivent être installées sur les bases des portes.
- Les briques d'aération doivent être munies de grilles de protection.
- Il peut être utile de couper le lierre et les autres plantes grimpantes sur les murs extérieurs.



Nettoyage des zones infectées

Les zones intérieures où les rongeurs ont été actifs peuvent être contaminées et risquent de transmettre des bactéries et des virus. L'utilisation d'un spray biocide approprié, tel que le Roshield Sanitiser & Cleaner Spray ou le Roshield Antibacterial Sanitiser Aerosol, permet d'éliminer les rongeurs et de réduire le risque.

Portez toujours un équipement de protection individuelle, y compris un masque approprié, lorsque vous nettoyez dans des espaces confinés ou des environnements non traités.

Conseils et astuces

- Lisez toujours l'étiquette du produit pour garantir une utilisation sûre.
- Si les souris domestiques n'entrent pas dans la boîte après plusieurs jours, mais qu'elles sont toujours actives, envisagez de déplacer la boîte dans un autre endroit, loin des zones ouvertes et de préférence à proximité des zones d'alimentation ou des sites de nidification.
- Si les souris domestiques ne s'intéressent toujours pas à la boîte, il est probable qu'elles disposent d'une autre source de nourriture, qu'il convient d'examiner plus avant et d'éliminer.
- Le piégeage peut également être une méthode efficace de lutte contre les souris domestiques. Les pièges peuvent être utilisés en conjonction avec l'appâtage pour fournir une approche à deux volets.
- Les souris domestiques se nourrissent à de nombreux endroits, il faut donc veiller à placer suffisamment de boîtes d'appât dans leur zone.
- Si les souris domestiques pénètrent librement dans la boîte mais ne prennent pas l'appât, utilisez une formulation d'appât différente (blocs ou pâtes) ou appâtez préalablement la boîte avec un aliment non toxique afin de gagner la confiance du rongeur.