

Anleitung für die Roshield Mouse Bait Box

ROSHIELD
CONTROL

Die Roshield-Box wurde entwickelt, um die sichere Ausbringung von Rodentiziden in Bereichen mit Hausmausaktivität zu ermöglichen und gleichzeitig den Zugang von Nicht-Zieltieren zu verhindern. Die abschließbare, manipulationssichere Konstruktion entspricht den Vorschriften für den sicheren Einsatz von Rodentiziden.

Diese Anweisungen variieren je nach gekauftem Bausatz, und bestimmte Zubehörteile sind möglicherweise nicht enthalten; im Zweifelsfall beziehen Sie sich bitte auf das Angebot, in dem der Kauf getätigt wurde. Nicht alle Kits enthalten Rodentizide.

Es ist unwahrscheinlich, dass Nicht-Nagetierarten in die Box gelangen, aber um dieses Risiko weiter zu minimieren, wird empfohlen, die Box an einem diskreten Ort aufzustellen.

hinter einem Sockel einer Küchenzeile. Die Verwendung zusätzlicher Materialien zur Abdeckung des Kastens trägt ebenfalls dazu bei, das Risiko von Störungen zu verringern und die Wahrscheinlichkeit der Köderaufnahme durch die Maus zu erhöhen.

Vor dem Aufstellen des Kastens sollte eine Untersuchung des Behandlungsgebiets durchgeführt werden, um die Schädlingsarten und etwaige Risiken zu ermitteln, die bekämpft werden müssen. Während der Untersuchung ist es wichtig, alle Nahrungsquellen, zu denen die Hausmäuse Zugang haben, zu identifizieren und zu entfernen. Einer der Hauptgründe für das Scheitern der Behandlung bei der Bekämpfung von Hausmäusen ist, dass die Nahrungsquelle der Mäuse nicht entfernt wird. Bleibt diese Nahrungsquelle bestehen, ist es für die Nagetiere wenig attraktiv, sich neue Nahrungsquellen zu suchen.



Das Öffnen der Box & das Innere der Box -

Wir haben ein Video mit der Anleitung produziert, das Sie auf der Amazon-Seite finden, auf der Sie die Boxen gekauft haben.


Zum Öffnen der Box wird der zweizinkige rote Schlüssel benötigt. Dieser befindet sich auf der Rückseite einer der Mausboxen.	Stecken Sie die Zinken des Schlüssels in die beiden Löcher an der Vorderseite des Kastens und drücken Sie darauf; der Deckel springt dann auf.	Im Inneren der Box befindet sich ein offener Bereich zwischen den beiden Eingängen. Dieser Bereich sollte leer bleiben, damit die Hausmäuse ungehindert eindringen können.
Auf der Rückseite der Box befindet sich ein Dorn. Dieser kann verwendet werden, um Block oder Pasta Rodentizid zu sichern, um sicherzustellen, dass der Köder in der Box zu allen Zeiten bleibt	In den meisten Fällen können die Boxen im Tätigkeitsbereich aufgestellt werden, ohne dass sie fixiert werden müssen. In manchen Situationen kann es von Vorteil sein, die Boxen zu fixieren Im Deckel der Box befinden sich zwei Löcher. Diese ermöglichen es, die Köderbox mit Draht in Position zu binden, um die Box in Position zu halten	Im Boden der Falle befinden sich zwei Löcher. Diese können dazu verwendet werden, die Box mit einer Schraube am Boden zu befestigen, um zu verhindern, dass die Box verschoben wird.

Köder für die Box mit Rodentizid

Der Roshield-Köder ist im Vereinigten Königreich und in der EU in drei Formulierungen erhältlich: Blöcke, Weizen und Nudeln.

Bevor Sie eine Behandlung mit einem Rodentizid durchführen, ist es wichtig, dass Sie die Anweisungen auf der Rückseite der Verpackung lesen und befolgen.

Als bewährte Praxis sollte der Köderspieß verwendet werden, um zu verhindern, dass Hausmäuse das Rodentizid aus der Box schleppen, was dazu führen kann, dass Nichtzieltiere den Köder aufnehmen. Der Spike erhöht außerdem die Wahrscheinlichkeit, dass Hausmäuse den Köder fressen. Es ist nicht praktikabel, Köder auf Weizenbasis in Köderboxen zu verwenden, da die Gefahr des Verschüttens besteht; Roshield empfiehlt nicht, Weizen in Boxen zu verwenden, sondern nur Pasta- und Blockformulierungen.

Blöcke: 	Die Roshield-Blöcke werden mit einem Loch in der Mitte hergestellt, so dass der Block leicht auf den Köderspieß in der hinteren Kammer der Box geschoben werden kann. Roshield empfiehlt, einen Block auf den Spike zu setzen	
Nudeln: 	Roshield-Nudeln werden aus weichem Material hergestellt, das sich leicht auf den Köderspieß drücken lässt. Es ist nicht notwendig, die innere Papierhülle zu entfernen, da Hausmäuse diese einfach durchkauen. Roshield empfiehlt, 1 - 2 Beutel auf den Stachel zu legen.	

Sobald der Köder ausgelegt ist, schließen Sie den Deckel fest. Die Box kann nun vorsichtig und sicher in dem Bereich platziert werden, in dem Hausmäuse aktiv sind.

Roshield-Mauskästen sollten in der Nähe von Bereichen aufgestellt werden, in denen die Hausmäuse aktiv fressen. Stellen Sie die Kästen nicht in offenen Bereichen auf, da Hausmäuse im Freien vorsichtig sind und weniger wahrscheinlich den Kasten betreten. Außerdem ist das Vorhandensein von Hausmauskot ein gutes Zeichen für Aktivität, und die Kästen sollten dort aufgestellt werden, wo der Kot am zahlreichsten ist. Vermeiden Sie es nach Möglichkeit, den Kot aus dem Bereich zu entfernen, in dem die Kästen aufgestellt sind, da das Vorhandensein von Kot die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Mäuse in die Kästen eindringen und die Behandlungszeit verkürzt wird.

Es kann einige Tage dauern, bis die Mäuse die Boxen betreten, da sie gegenüber unbekannten Gegenständen in ihrem Revier vorsichtig sein können. Dies ist ein häufiges Problem und kein Zeichen für ein fehlerhaftes Produkt.

Die Menge der Köder, die zur Bekämpfung eines Befalls erforderlich ist, variiert. Es ist wichtig zu wissen, dass Hausmäuse sporadische Fresser sind und kleine Futtermengen an verschiedenen Stellen aufnehmen. Daher ist es notwendig, mehrere Köderdosen im Fressbereich der Mäuse aufzustellen, um sicherzustellen, dass die Mäuse genügend Köder aufnehmen. Das Auslegen der Köder sollte so lange fortgesetzt werden, bis die Aktivität der Mäuse nachlässt, da eine zu geringe Anzahl von Ködern zu einem Misserfolg der Behandlung führen kann.

Die Aktivität kann zu Beginn der Behandlung deutlicher werden, da die Hausmäuse nach dem Verzehr des Köders langsam werden können. Dies ist ein typisches Zeichen für die Wirkung des Rodentizids. Es ist wichtig, dass die Nagetierkadaver entfernt werden, um zu verhindern, dass andere Tiere die toten Nagetiere fressen.

Wenn die Köder nicht mehr angenommen werden und der Befall anscheinend getilgt ist, muss die Köderdose unbedingt entfernt und sicher aufbewahrt werden.

Nach der Behandlung

Sobald die Population unter Kontrolle ist, sollten Schritte unternommen werden, um ein erneutes Auftreten zu verhindern. Eine gängige Methode zur Verhinderung des Eindringens anderer Nagetiere ist die Sicherung der Eintrittsstellen; im Folgenden werden einige gängige Beispiele für die Sicherung genannt:

- Mäuse können sich durch ein Loch mit einem Durchmesser von etwa 5 mm Zugang verschaffen - das entspricht etwa dem Durchmesser eines Kugelschreibers!
- Bringen Sie Drahtwolle oder Drahtgeflecht in den Zwischenräumen von Rohren und Kabeln an, sowohl innen als auch außen.
- An den Türsockeln sollten Borstenstreifen angebracht werden.
- Roshield Mesh Schutzvorrichtungen sollten an Lüftungssteinen angebracht werden.
- Das Zurückschneiden von Efeu und anderen Kletterpflanzen an Außenwänden kann von Vorteil sein.



Reinigung der infizierten Bereiche

Innenbereiche, in denen Nagetiere aktiv waren, können kontaminiert werden und das Risiko einer Übertragung von Bakterien und Viren bergen. Mit einem geeigneten Biozidspray wie dem Roshield Sanitiser & Cleaner Spray oder dem Roshield Antibacterial Sanitiser Aerosol kann die Verunreinigung entfernt und das Risiko reduziert werden.

Tragen Sie immer eine persönliche Schutzausrüstung, einschließlich einer geeigneten Maske, wenn Sie in engen Räumen oder unbehandelten Umgebungen reinigen.

Hinweise und Tipps

- Lesen Sie immer das Produktetikett, um eine sichere Anwendung zu gewährleisten.
- Wenn die Hausmäuse auch nach mehreren Tagen nicht in den Kasten kommen, aber immer noch aktiv sind, sollten Sie den Kasten an einen anderen Ort versetzen, weg von offenen Bereichen und vorzugsweise in der Nähe von Futterstellen oder Nistplätzen.
- Wenn die Hausmäuse immer noch kein Interesse an der Box zeigen, haben sie wahrscheinlich eine alternative Nahrungsquelle, die weiter untersucht und entfernt werden sollte.
- Fallen können auch eine wirksame Methode zur Bekämpfung von Hausmäusen sein. Fallen können in Verbindung mit Ködern eingesetzt werden, um einen zweigleisigen Ansatz zu verfolgen.
- Hausmäuse ernähren sich von vielen Orten, daher sollten Sie sicherstellen, dass genügend Köderboxen in ihrem Gebiet aufgestellt werden.
- Wenn die Hausmäuse die Box ungehindert betreten, aber den Köder nicht annehmen, verwenden Sie eine andere Köderformulierung (Block oder Nudeln) oder ködern Sie die Box vorab mit einem ungiftigen Futter, um das Vertrauen der Nager zu gewinnen.