


Instrucciones para la caja de cebo para ratones Roshield



La caja Roshield ha sido diseñada para permitir la aplicación segura de rodenticida en zonas de actividad de ratones domésticos, impidiendo al mismo tiempo el acceso de animales no objetivo. El diseño a prueba de manipulaciones con cerradura cumple la normativa sobre el uso seguro de rodenticidas.

Estas instrucciones varían en función del kit adquirido, y es posible que no se incluyan determinados accesorios; en caso de duda, consulte el listado donde se realizó la compra. No todos los kits incluyen rodenticida.



Es poco probable que entren en la caja especies que no sean roedores, pero para minimizar aún más este riesgo, se recomienda colocar la caja en un lugar discreto. La ubicación como, por ejemplo, detrás del zócalo de un mueble de cocina. El uso de materiales adicionales para cubrir la caja también ayudará a reducir el riesgo de interferencias y aumentará la probabilidad de que el ratón consuma el cebo.

Antes de colocar la caja, debe realizarse una inspección de la zona de tratamiento para identificar las especies de plagas y cualquier riesgo que deba controlarse. Durante la inspección, es esencial identificar y eliminar cualquier fuente de alimento a la que tengan acceso los ratones domésticos. Una de las principales razones del fracaso de los tratamientos contra los ratones domésticos es que no se elimina su fuente de alimento. Cuando esta fuente de alimento permanece, el roedor tiene poco atractivo para buscar nuevas fuentes de alimento.

Abrir la caja y dentro de la caja -

Hemos creado un vídeo con las instrucciones, que encontrará en la página de Amazon en la que compró las cajas.


Para abrir la caja se necesita la llave roja de dos puntas. Se encuentra en la parte trasera de una de las cajas de ratón.	Inserte las puntas de la llave en los dos orificios de la parte delantera de la caja y empuje; la tapa se abrirá.	Dentro de la caja hay una zona abierta entre los dos puntos de entrada. Esta zona debe dejarse vacía para que los ratones domésticos puedan entrar libremente.
En la parte posterior de la caja hay un pincho. Se puede utilizar para fijar el bloque o la pasta rodenticida para garantizar que el cebo permanezca en la caja en todo momento.	En la mayoría de los casos, las cajas pueden colocarse en la zona de actividad sin necesidad de fijarlas en su posición. En algunas situaciones, puede ser beneficioso fijar las cajas en posición	En la tapa de la caja hay dos orificios. Permiten atar la caja con alambre para mantenerla en su posición.
		En el suelo de la trampa hay dos orificios. En ellos se puede fijar la caja al suelo con un tornillo para evitar que se mueva.

Cebat la caja con rodenticida

El cebo Roshield est disponible en tres formulaciones en el Reino Unido y la UE: bloques, trigo y pasta.

Antes de emprender cualquier tratamiento con rodenticida, es importante que lea y respete las instrucciones que figuran en la parte posterior del envase.

Como prctica recomendada, el pincho para el cebo debe utilizarse para evitar que los ratones domsticos arrastren el rodenticida fuera de la caja, lo que puede provocar que otros animales consuman el cebo. La pa tambin aumenta la probabilidad de que los ratones domsticos se alimenten del cebo. No es factible utilizar cebos a base de trigo dentro de las cajas de cebo debido al riesgo de derrame; Roshield no recomienda el uso de trigo en las cajas slo en las formulaciones de pasta y bloque.

Bloques: 	Los bloques Roshield se fabrican con un orificio en el centro que permite introducirlos fcilmente en el pincho de cebo situado en la cmara trasera de la caja. Roshield recomienda insertar un bloque en la espiga.	
Pasta: 	La pasta Roshield se fabrica como un material blando que puede empujarse fcilmente hacia el pincho del cebo. No es necesario retirar la funda de papel interna; los ratones domsticos simplemente la masticarn directamente. Roshield recomienda insertar 1  2 sobres en la espiga.	

Una vez instalado el cebo, cierre bien la tapa. La caja ya est lista para colocarla con cuidado y seguridad en la zona de actividad de los ratones domsticos.

Las cajas para ratones de Roshield deben colocarse cerca de zonas en las que los ratones domsticos se alimenten activamente; no coloque las cajas en zonas abiertas, ya que los ratones domsticos son cautelosos cuando estn al aire libre y es menos probable que entren en la caja. Adems, la presencia de excrementos de ratones domsticos es una buena seal de actividad, por lo que las cajas deben colocarse donde los excrementos sean ms numerosos. Si es posible, evite eliminar los excrementos de la zona en la que se coloquen las cajas, ya que la presencia de excrementos aumentar la probabilidad de que los ratones entren en las cajas y acelerar los tiempos de tratamiento.

Pueden pasar varios das antes de que los ratones entren en las cajas, ya que pueden ser cautelosos con los objetos desconocidos colocados en su territorio. Se trata de un problema habitual y no de un producto defectuoso.

La cantidad de cebo necesaria para controlar una infestacin vara. Es importante tener en cuenta que los ratones domsticos se alimentan de forma espordica y consumen pequeas cantidades de comida en varios lugares. Por lo tanto, es necesario colocar varias cajas de cebo en la zona de alimentacin de los ratones para asegurarse de que consumen suficiente cebo. El cebado debe continuar hasta que cese toda actividad, ya que un cebado insuficiente puede hacer fracasar los tratamientos.

La actividad puede ser ms evidente al inicio del tratamiento, ya que los ratones domsticos pueden volverse lentos tras consumir el cebo. Este es un signo tpico de que el rodenticida est haciendo efecto. Es esencial retirar los cadveres de los roedores para evitar que otros animales se los coman.

Cuando ya no se tomen los cebos y parezca que la infestacin ha sido erradicada, es esencial retirar la caja de cebos y guardarlos en un lugar seguro.

Después del tratamiento

Una vez controlada la población, deben tomarse medidas para evitar su reaparición. El control de los puntos de entrada es un método habitual para evitar la entrada de otros roedores:

- Los ratones pueden acceder a través de un orificio de aproximadamente 5 mm de diámetro, ¡el mismo diámetro que un bolígrafo!
- Instale lana de alambre o malla en los huecos alrededor de tuberías y cables, tanto en ubicaciones internas como externas.
- Deben instalarse tiras de cerdas en las bases de las puertas.
- En los ladrillos de ventilación deben colocarse protectores de malla Roshield.
- Recortar la hiedra y otras plantas trepadoras de las paredes exteriores puede ser beneficioso.



Limpieza de zonas infectadas

Las zonas internas en las que los roedores han estado activos pueden contaminarse y suponer un riesgo de transmisión de bacterias y virus. Utilizando un aerosol biocida adecuado, como Roshield Sanitiser & Cleaner Spray o Roshield Antibacterial Sanitiser Aerosol, se pueden eliminar y reducir los riesgos.

Utilice siempre equipo de protección personal, incluida una mascarilla adecuada, cuando limpie en espacios confinados o en entornos no tratados.

Consejos y sugerencias

- Lea siempre la etiqueta del producto para garantizar un uso seguro.
- Si los ratones domésticos no entran en la caja después de varios días, pero siguen activos, considere la posibilidad de trasladar la caja a un lugar alternativo, lejos de zonas abiertas y preferiblemente cerca de zonas de alimentación o nidificación.
- Si los ratones domésticos siguen sin mostrar interés por la caja, es probable que tengan una fuente de alimento alternativa, que debe investigarse más a fondo y eliminarse.
- El trampeo también puede ser un método eficaz de control de los ratones domésticos; las trampas pueden utilizarse junto con los cebos para proporcionar un enfoque doble.
- Los ratones domésticos se alimentan en muchos lugares, así que asegúrese de colocar suficientes cajas de cebo en su zona.
- Si los ratones domésticos entran libremente en la caja pero no muerden el cebo, utilice una formulación diferente de cebo (bloque a pasta) o cebe previamente la caja con un alimento no tóxico para ganarse la confianza del roedor.